


# 服用方法


リベルサス®錠を服用される方へ



空腹時(1日の最初の  
飲食の前)に服用して  
ください。起床時がお  
すすめです。



1錠をコップ約半分の  
水(約120mL以下)と  
ともに服用してくだ  
さい。



服用後に、飲み物を飲ん  
だり、食事をしたり、他の  
お薬を服用する場合は、  
少なくとも**服用後30分**  
経ってからにしてください。



リベルサス®錠  
患者さん向けWEBページ

<https://www.novonordisk.co.jp/products/how-to/rybelsus.html>




# 服用時の注意点



リベルサス®は湿気と光の影響を受けやすいお薬です。服用の直前に錠剤をシートから取り出してください。



錠剤を割ったり、砕いたり、嚙んだりせずに、丸ごと飲み込んでください。



お茶、コーヒー、あるいは服薬ゼリーなどでの服用はせず、約120mL以下の水で服用してください。

JP21RYB00120  
RYB21PA0152  
(2021年8月作成)

製造販売元

**ノボ ルディスク ファーマ株式会社**  
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1  
[www.novonordisk.co.jp](http://www.novonordisk.co.jp)

販売提携

**MSD株式会社**  
〒102-8667 東京都千代田区九段北1-13-12 北の丸スクエア  
<http://www.msd.co.jp/>